

a fórmula



Óvulo vaginal

Praticidade, rapidez e efetivo

Estudos



<http://aformulabr.com.br/qrcode/ovulovagafv01.pdf>



Óvulo vaginal

Praticidade, rapidez e efetivo

DESCRIÇÃO

Preparação farmacêutica de consistência firme, forma cônica, destinada à aplicação vaginal, área essa que fácil absorção de fármacos, sem ocasionar irritação, composta por polietilenoglicóis específicos ou mistura de gelatina glicerinada, destinado em muitos momentos ao tratamento de infecções vaginais.

VANTAGENS

- ✓ Conveniência à usuária;
- ✓ Exatidão da dose;
- ✓ Sem efeito de primeira passagem e interferências de fluidos gastrointestinais;
- ✓ Via de administração para ativos com meia-vida curta, de baixo índice terapêutico e baixa disponibilidade oral ou irritante à mucosa gastrointestinal;
- ✓ Interrupção de forma rápida e segura caso o paciente apresente reação adversa ou tóxica;

INDICAÇÕES

Diferentes classes farmacêuticas para o tratamento da saúde da mulher (ex: probióticos, ácidos, fitoterápicos, podofilina, antifúngicos, hormônios, etc).

MODO DE USO

Lavar as mãos; remover a embalagem do óvulo; deitar, flexionar e afastar as pernas; cuidadosamente aplicar via intravaginal, tanto quanto possível, em dose e número de vezes a dia conforme critério médico.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Óleo de melaleuca 200mg
Óvulo intravaginal qsp.....1 un.

Modo de uso: aplicação intravaginal antes de deitar.
Indicação: infecção bacteriana mista e vulvovaginite de repetição por *Candida sp.*

L.acidophilus..... 1 bilhão UFC
Óvulo intravaginal qsp.....1 un.

Modo de uso: aplicação intravaginal antes de deitar.
Indicação: vulvovaginites bacterianas, fúngicas e por *Trichomonas.*

Progesterona micronizada 100mg*
Óvulo intravaginal qsp.....1 un.

Modo de uso: aplicação intravaginal, 1 a 2 unidades ao dia, por 14 dias, iniciando 2 dias após a ovulação. Se concepção ocorrer durante o tratamento, a progesterona deve ser continuada, de forma ininterrupta, até 10ª semana de gravidez.
Indicação: insuficiência do corpo lúteo.
 Conc: 25,50,75 mg.

Estradiol base 1mg
Óvulo intravaginal qsp.....1 un.

Modo de uso: a critério médico.
Indicação: TRH.
 Obs: 10-25 mcg/dose ao dia na vaginite atrófica.

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

BATISTUZZO, J. A O; ITAYA, M.; ETO, Y. **Formulário Médico-Farmacêutico**. 5 ed. São Paulo: Pharmabooks, 2015.

FERREIRA, Anderson de Oliveira; BRANDÃO, Antônio Fernandes; POLONINI, Hudson Cateano. Guia Prático da Farmácia Magistral. Juiz de Fora: Editor Editora Associada Ltda, 2018.



OUTRAS SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Clotrimazol 100mg
Óvulo intravaginal qsp.....1 un.

Modo de uso: dose única de 500mg intravaginal ao deitar. Para gestantes, após o 3º mês de gravidez, 1 óvulo de 100mg/dia durante 7 dias consecutivos. Em casos mais severos de candidíase vulvovaginal, o tratamento em dose única a 500mg pode não ser eficaz. Nesse caso, o tratamento a 100mg/dia, durante 7 dias é mais recomendado. A dose profilática de manutenção recomendada é um óvulo de 100mg, 2 vezes por semana, durante 6 meses, ou a critério médico.

Indicação: vulvovaginite por *Cândida albicans*, tricomoníase.

Ácido bórico 600mg
Óvulo intravaginal qsp.....1 un.

Modo de uso: 2 óvulos diariamente, por 2 semanas, ou a critério médico.

Indicação: vulvovaginite por *Cândida albicans*,

Borato de sódio 150mg
Óvulo intravaginal qsp.....1 un.

Modo de uso: 1 óvulo, 1 vez ao dia, ou a critério médico.

Indicação: candidíase vulvovaginal.

Óleo essencial Calêndula (*Calendula officinalis* L.).....3%
Óvulo intravaginal qsp.....1 un.

Modo de uso: 1 óvulo, 1 vez ao dia, ou a critério médico.

Indicação: candidíase vulvovaginal.

Acetato de clostebol.....25mg
 Sulfato de neomicina.....25mg
Óvulo intravaginal qsp.....1 un.

Modo de uso: 1 óvulo, 1, 2 vezes ao dia, ou a critério médico.

Indicação: cicatrizante.

Citrato de sildenafil.....25mg
Óvulo intravaginal qsp.....1 un.

Modo de uso: 1 óvulo, 4 vezes ao dia, por 7 dias, ou a critério médico.

Indicação: melhora do fluxo arterial uterino, desenvolvimento do endométrio, para fertilização *in vitro*.

Tintura de thuya (*Thuya occidentalis*)0,25ml
Óvulo intravaginal qsp.....1 un.

Modo de uso: 1 óvulo uso noturno, ou a critério médico.

Indicação: condiloma acuminato.

Tioconazol300mg
Óvulo intravaginal qsp.....1 un.

Modo de uso: 1 óvulo, 1 vez por semana ou a critério médico.

Indicação: candidíase vaginal.

REFERÊNCIAS

BATISTUZZO, J. A O; ITAYA, M.; ETO, Y. **Formulário Médico-Farmacêutico**. 5 ed. São Paulo: Pharmabooks, 2015.

FERREIRA, Anderson de Oliveira; BRANDÃO, Antônio Fernandes; POLONINI, Hudson Cateano. **Guia Prático da Farmácia Magistral**. Juiz de Fora: Editor Editora Associada Ltda, 2018.

